Diskretne strukture

Gašper Fijavž

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani

30. november 2026

Deljivost celih števil

Izrek (o deljenju)

Naj bosta $m, n \in \mathbb{Z}$ *in* $m > 0$. *Obstajata enolično določeni celi števili* k *in* r, *pri čemer je*

$$n = k \cdot m + r \quad \textit{in velja} \quad 0 \leq r < m.$$

k je *kvocient* števil n in m
r je *ostanek* pri deljenju števila n z m.

Deljivost celih števil

Naj bosta $m, n \in \mathbb{Z}$. Pravimo, da m *deli* n,

$$m|n,$$

če ima enačba $n = x \cdot m$ celoštevilsko rešitev.

Če m, n nista enaka 0, potem lahko definiramo

$$\gcd(m, n) = \max\{d \in \mathbb{Z} \,;\, d|m \text{ in } d|n\}$$

največji skupni delitelj števil m in n

$$\operatorname{lcm}(m, n) = \min\{v \in \mathbb{Z} \,;\, m|v \text{ in } n|v \text{ in } v > 0\}$$

najmanjši skupni večkratnik števil m in n

gcd in lcm sta *komutativni* in *asociativni* operaciji.

Razširjeni Evklidov Algoritem - REA

Zgled: Poišči $\gcd(899, 812)$.

Razširjeni Evklidov Algoritem - REA

Izrek (REA)

$$\gcd(m, n) \;=\; r \;=\; s \cdot m + t \cdot n$$

Največji skupni delitelj $\gcd(m, n)$ *števil* m *in* n *dobimo kot zadnji neničelni ostanek v REA. Obenem* $\gcd(m, n)$ *zapišemo tudi kot celoštevilsko linearno kombinacijo števil* m *in* n.

Tuja števila

Pravimo, da sta si celi števili a in b *tuji*, če je $\gcd(a, b) = 1$.

V tem primeru pišemo $a \perp b$.

Zgled: $89 \perp 81$

Velja tudi: $5 \perp 7,\ 7 \perp 37,\ 37 \perp 101,\ 101 \perp 214$

Tuja števila

Trditev

Naj velja $a|(b \cdot c)$ *in* $a \perp b$. *Potem* $a|c$.

Izrek

Naj bosta $a, b \in \mathbb{N}$. *Potem je* $\gcd(a, b) \cdot \mathrm{lcm}(a, b) = a \cdot b$.

Diofantske enačbe

Naloga: Skupina otrok je v slaščičarni jedla torte in kremne rezine. Koliko tort in koliko kremnih rezin so pojedli, če je račun znašal 98,25€, kremna rezina stane 6,75€, torta pa 5,25€.

Vemo tudi, da so pojedli več tort kot kremnih rezin.

Diofantske enačbe

Enačba je *diofantska*, če ima celoštevilske podatke in iščemo celoštevilske rešitve.

Linearna diofantska enačba z dvema neznankama je enačba oblike

$$a \cdot x + b \cdot y = c,$$

kjer so znani $a, b, c \in \mathbb{Z}$, iščemo pa celoštevilsko rešitev x, y.
a in b sta *koeficienta* enačbe, c standardno imenujemo *desna stran*.

Diofantske enačbe

Zgled: Poišči rešitve (linearne) diofantske enačbe $6x + 15y = 7$.

Izrek

Linearna diofantska enačba

$$a \cdot x + b \cdot y = c$$

je rešljiva natanko tedaj, ko $\gcd(a, b) | c$.

Če $\gcd(a, b)$ *ne deli desne strani* c*, potem taka diofantska enačba nima rešitev.*

Diofantske enačbe

Izrek

Naj par x_0, y_0 reši LDE $a \cdot x + b \cdot y = c$, in naj bo $d = \gcd(a, b)$. Potem so

$$\begin{aligned} x_k &= x_0 + t \cdot \frac{b}{d} \\ y_k &= y_0 - t \cdot \frac{a}{d}, \end{aligned}$$

kjer je t poljubno celo število, vse rešitve te diofantske enačbe.

Diofantske enačbe

Izrek

Linearna diofantska enačba

$$a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \ldots + a_n \cdot x_n = c$$

je rešljiva natanko takrat, ko

$$\gcd(a_1, a_2, \ldots, a_n) | c.$$

Praštevila

Naravno število $n \geq 1$ je *praštevilo*, če ima natanko dva pozitivna delitelja.

Sicer je 1 ali pa *sestavljeno število*.

Praštevila do 100:
$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$

Par praštevil oblike $(p, p+2)$ imenujemo *praštevilska dvojčka*.

Praštevila

Trditev

- *p praštevilo in $a \in \mathbb{Z}$. Potem $p|a$ ali $p \perp a$.*
- *p praštevilo, $a, b \in \mathbb{Z}$. Če $p|(a \cdot b)$, potem $p|a$ ali $p|b$.*
- *vsako naravno število $n \geq 2$ je deljivo s katerim od praštevil.*

Praštevil je neskončno mnogo

Izrek (Evklid)

Obstaja neskončno mnogo praštevil.

Enolični razcep

Izrek

Vsako naravno število $n \geq 2$ lahko zapišemo kot produkt praštevil.

Zapis je enoličen, če se ne oziramo na vrstni red faktorjev.

Eulerjeva funkcija φ

Eulerjeva funkcija $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ je definirana takole:

$$\varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \,;\, 1 \leq k \leq n \text{ in } k \perp n\}|$$

$\varphi(n)$ je število števil med 1 in n, ki so tuja n.

Zgled:

$\varphi(4) = 2$	1,2,3,4
$\varphi(5) = 4$	1,2,3,4,5
$\varphi(6) = 2$	1,2,3,4,5,6

Kako računamo Eulerjevo funkcijo

Trditev
Če je p praštevilo, je $\varphi(p) = p - 1$.

Trditev
Če je p praštevilo, je $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$.

Trditev
Če $a, b \in \mathbb{N}$ in $a \perp b$, potem je $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

Kako računamo Eulerjevo funkcijo

Izrek

Naj bo $n = {p_1}^{k_1} {p_2}^{k_2} \cdots {p_m}^{k_m}$, *kjer so* $p_1, p_2, \ldots, p_m$ *različna praštevila. Potem je*

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right).$$

Kongruence

Naj bo $a \in \mathbb{Z}$ in $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

$$a \bmod m$$

je ostanek a-ja pri deljenju z m.

Definirajmo relacijo, *kongruenco po modulu* m, z naslednjim opisom:

$$a \equiv b \pmod{m} \quad ntk. \quad m|(a - b) \quad ntk. \quad a \bmod m = b \bmod m$$

Lastnosti kongruenc

1. *kongruenca po modulu m* je ekvivalenčna relacija v $\mathbb{Z}$
2. Če velja $a \equiv b \pmod{m}$, potem je
$$a \pm c \equiv b \pm c \pmod{m}$$
$$a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$$
$$a^n \equiv b^n \pmod{m}$$
3. Če velja $a \equiv b \pmod{m}$ in $c \equiv d \pmod{m}$, potem je
$$a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$$
$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$$
4. Če velja $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ in $c \perp m$, potem je $a \equiv b \pmod{m}$

Zgledi

Zgledi:

- Izračunaj ostanek pri deljenju števila 3^{120} s 13.
- Izračunaj zadnjo cifro števila $9^{8^{7^6}}$.
- Izračunaj ostanek pri deljenju števila $9^{8^{7^6}}$ z 11.

Rezultati

Izrek (Eulerjev)

Naj bo $a \in \mathbb{Z}$, $m \geq 2 \in \mathbb{N}$ in $a \perp m$. Potem je

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Izrek (mali Fermatov)

Če je p praštevilo in $a \perp p$, potem je

$$a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Za vse $a \in \mathbb{Z}$ pa velja

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

RSA kriptosistem

Trditev

Naj bosta p in q različni praštevili. Potem je

$$a \equiv b \pmod{p} \quad \textit{in} \quad a \equiv b \pmod{q}$$

natanko tedaj, ko je

$$a \equiv b \pmod{pq}.$$

Trditev

Naj bosta p in q različni praštevili. Potem za poljubni naravni števili a in k velja

$$a^{k \cdot \varphi(pq)+1} \equiv a^{k \cdot (p-1)(q-1)+1} \equiv a \pmod{pq}$$

RSA kriptosistem

RSA kriptosistem deluje na principu *javnih* in *privatnih ključev*.

Pogovarjajmo se o dveh uporabnikih *Ančki* in *Borutu*. Vsak izmed njiju ima svoj *privatni ključ* P_A, P_B, ki ga hrani na skrivnem mestu, svoj *javni ključ* J_A, J_B da na vpogled vsem.

RSA kriptosistem

Komunikacija med Ančko in Borutom:

- Ančka bi rada Borutu posredovala sporočilo x:

  $x,\ J_B(x) \quad \overset{!}{\longrightarrow} \quad J_B(x),\ P_B(J_B(x)) = x$
- Ančka bi rada Borutu posredovala sporočilo x in Borut bi rad bil prepričan, da mu je sporočilo res posredovala Ančka:

  $x,\ P_A(x),\ J_B(P_A(x)) \quad \overset{!}{\longrightarrow}$

  $\overset{!}{\longrightarrow} \quad J_B(P_A(x)),\ P_B(J_B(P_A(x))) = P_A(x),\ J_A(P_A(x)) = x$

Veljati mora:

1. P_A in J_A kot tudi P_B in J_B sta *inverzni preslikavi*.
2. Če poznamo J_A iz tega ne moremo (vsaj ne enostavno) izračunati P_A.