

## OMEJENI KVANTIFIKATORJI

Zapis s pomočjo *omejenih kvantifikatorjev* je, strogo gledano, zloraba izjavnih formul — jezika, ki ga uporabljamo v predikatnem računu. Pa vendar ga srečamo vsepo vsod v matematični literaturi, zato vseeno razčistimo pojme.

### motivacija

Interpretacija  $\mathcal{I}$  izjavne formule zahteva, da si izberemo področje pogovora  $\mathcal{D}$ . Denimo, da je v naši interpretaciji resnična formula  $\forall xW$ . Če izbreremo “isto” interpretacijo z nekoliko večjim področjem pogovora  $\mathcal{D}'$ , pa formula  $\forall xW$  morda ni več resnična.

Opazujmo formulo  $V = \forall x(S(x) \wedge L(x))$ . Če govorimo o naravnih številih, predikat  $S$  naj označuje sodost in predikat  $L$  lihost, pridelamo resnično izjavo. Toda ista formula  $V$  postane neresnična, če področje pogovora razširimo na vsa realna števila, četudi “ohranimo” pomena predikatov  $S$  in  $L$ . Omejeni kvantifikatorji rešujejo predstavljeni težavo.

Zapis

$$\forall x \in \mathbb{N} (S(x) \wedge L(x))$$

beremo kot: *Za vsak x iz množice naravnih števil velja, da je x sod ali x lih.* Področje pogovora, če le vsebuje množico naravnih števil, ne vpliva več na pravilnost izjave. Zgornja izjava ima isto logično vrednost, ne gleda na to, ali govorimo o celih, racionalnih, realnih ali celo kompleksnih številih.

Seveda se lahko omejenim kvantifikatorjem izognemo. Uporabiti pa moramo dodaten predikat. V zgornjem primeru takšnega, ki označuje pripadnost množici naravnih števil:  $N(x)$  naj pomeni “*x je naravno število.*” V tem primeru je

$$\forall x \in \mathbb{N} (S(x) \wedge L(x)) \sim \forall x (N(x) \Rightarrow S(x) \wedge L(x))$$

### definicija

Naj bo  $\mathcal{A}$  podmnožica področja pogovora in  $A(x)$  predikat, ki pomeni  $x \in \mathcal{A}$ . Omejena univerzalni in eksistenčni kvantifikator definiramo takole:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathcal{A} (W) &\stackrel{\text{def}}{\sim} \forall x (A(x) \Rightarrow W) \\ \exists x \in \mathcal{A} (W) &\stackrel{\text{def}}{\sim} \exists x (A(x) \wedge W) \end{aligned}$$

### še en zgled

Reciklirajmo zgoraj omenjeni predikata  $N$ ,  $P(x)$  pa naj pomeni “*x lahko pišemo kot produkt praštevil.*” *Vsako naravno število lahko pišemo kot produkt praštevil.*

$$\forall x (N(x) \Rightarrow P(x)) \sim \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

## **zakoni z omejenimi kvantifikatorji**

Obnašanje je ravno takšno, kot pričakujemo.

$$\begin{aligned}\neg \forall x \in \mathcal{A}(W) &\sim \exists x \in \mathcal{A} \neg(W) \\ \neg \exists x \in \mathcal{A}(W) &\sim \forall x \in \mathcal{A} \neg(W)\end{aligned}$$

Za polovico dokaza je potrebno dvakrat uporabiti definicijo in prenesti negacijo preko običajnega kvantifikatorja:

$$\begin{aligned}\neg \forall x \in \mathcal{A}(W) &\sim \neg \forall x (A(x) \Rightarrow W) \\ &\sim \neg \forall x (\neg A(x) \vee W) \\ &\sim \exists x \neg(\neg A(x) \vee W) \\ &\sim \exists x (A(x) \wedge \neg W) \\ &\sim \exists x \in \mathcal{A} \neg(W)\end{aligned}$$

Manjkajoči račun opravimo analogno.