

# Ploščina trikotnika z oglišči na treh krožnicah

V ravnini  $\mathbb{R}^2$  imamo tri krožnice:  $K_1$ ,  $K_2$  in  $K_3$ . Trikotnik  $ABC$  ima oglišče  $A$  na krožnici  $K_1$ , oglišče  $B$  na  $K_2$  in oglišče  $C$  na  $K_3$ . Med vsemi takimi trikotniki  $ABC$  želimo poiskati tistega z največjo ploščino. Označimo s  $(p_i, q_i)$  koordinate središča krožnice  $K_i$ , z  $r_i > 0$  pa polmer krožnice  $K_i$ . Napišite program, ki za tri krožnice dane s  $[p_i, q_i, r_i]^T$  poišče trikotnik  $ABC$  z največjo ploščino.

## Naloga

1. Nalogo rešite tako, da poiščete *minimum* ustrezne funkcije treh spremenljivk z metodo najhitrejšega spusta. Nasvet: Držite se spodnjih opornih točk, da določite gradient ustrezne funkcije treh spremenljivk. (Seveda lahko rabo metode najhitrejšega spusta ustrezno prilagodite...)
  - (a) Naj bodo  $\mathbf{p}_1$ ,  $\mathbf{p}_2$  in  $\mathbf{p}_3$  parametrizacije treh (zaenkrat poljubnih) ravninskih krivulj. Zapišite formulo za ploščino trikotnika z oglišči na teh treh krivuljah. Krajevni vektorji oglišč tega trikotnika so torej  $\mathbf{p}_1(t)$ ,  $\mathbf{p}_2(u)$  in  $\mathbf{p}_3(v)$ , ploščina tega trikotnika pa je funkcija treh spremenljivk, označimo jo z  $f(t, u, v)$ .
  - (b) Izrazite gradient funkcije  $-f^2$  le z uporabo parametrizacij  $\mathbf{p}_1$ ,  $\mathbf{p}_2$  in  $\mathbf{p}_3$  ter njihovih odvodov  $\dot{\mathbf{p}}_1$ ,  $\dot{\mathbf{p}}_2$  in  $\dot{\mathbf{p}}_3$ . Namig: Verižno pravilo.
  - (c) Zapišite parametrizacijo krožnice s polmerom  $r$  in središčem v točki  $(p, q)$ .
  - (d) Kako se izraža  $\text{grad}(-f^2)$ , ko so  $\mathbf{p}_1$ ,  $\mathbf{p}_2$  in  $\mathbf{p}_3$  parametrizacije treh krožnic? Namig: Spet verižno pravilo.
2. Poiščite ustrezen lokalni minimum funkcije  $-f^2$  z metodo najhitrejšega spusta. Iz parametrov  $t$ ,  $u$  in  $v$ , pri katerih  $-f^2$  zavzame minimum, nato izračunajte krajevne vektorje oglišč trikotnika z največjo ploščino in njegovo dejansko ploščino.
3. Napišite funkcijo `[T, p1] = trikotnik(K)`, ki vrne krajevne vektorje oglišč trikotnika v `T` in ploščino trikotnika v `p1`.
  - (a) `T` naj bo  $2 \times 3$  matrika krajevnih vektorjev oglišč tega trikotnika, kjer je prvo oglišče na prvi krožnici, drugo na drugi in tretje na tretji. Koordinate oglišč naj bodo izračunane na **8 decimalk** natančno (absolutna napaka).
  - (b) `p1` naj bo ploščina tega trikotnika.
  - (c) `K = [k1, k2, k3]` naj bo  $3 \times 3$  matrika s stolpci oblike  $\mathbf{k}_i = [p_i, q_i, r_i]^T$ , kjer je  $r_i$  polmer,  $(p_i, q_i)$  pa središče krožnice  $K_i$ .
4. Datoteki `trikotnik.m` dodajte komentarje, test in demo. Za test poiščite primerno konfiguracijo krožnic, za katero znate uganiti (ali poiskati) rešitev direktno. Demo naj nariše vse tri krožnice in trikotnik z oglišči na teh treh krožnicah, ki ima največjo ploščino.

Podatke za demo vzemite iz svoje vpisne številke: prve tri številke naj bodo  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ , zadnje tri številke  $q_1$ ,  $q_2$  in  $q_3$ ,  $i$ -ti polmer pa dobite iz  $r_i = p_i + q_i + 1$ . (Vaša vpisna številka je torej `p1p2p3**q1q2q3`.)

**Opozorilo:** Zgoraj opisana metoda je občutljiva na orientacijo trikotnika, tj. izbiro zaporedja oglišč trikotnika. Temu se v splošnem ne da izogniti, saj je končna rešitev lahko trikotnik s pozitivno ali negativno orientacijo. Vseeno želimo, da funkcija trikotnik res vrne trikotnik z največjo ploščino. Razmislite, kako rešiti to težavo. (*Namig:* Zamenjava vrstnega reda dveh oglišč spremeni orientacijo trikotnika.)

## Oddaja naloge

Na spletno učilnico oddajte naslednje:

1. datoteko **trikotnik.m**, ki naj vsebuje komentarje, test in demo,
2. datoteko **resitev.pdf**, ki vsebuje izpeljavo rešitve in odgovore na vprašanja.

S kolegi se lahko posvetujete in lahko tudi skupaj rešujete nalogo, vendar morate program in poročilo izdelati sami. Uporabljate lahko vse Octave funkcije, ki smo jih izdelali na vajah.