

# Diskretne strukture

Gašper Fijavž

Fakulteta za računalništvo in informatiko  
Univerza v Ljubljani

30. oktober 2024

## Operacije z množicami

*relacija pripadnosti* ...  $x \in A$   
 $x$  *pripada*  $A$ .

*podajanje množic*

- ▶ z naštevanjem elementov  $A = \{0, 1, 2\}$
- ▶ z neko izjavno formulo  $A = \{x ; \varphi(x)\}$   
Velja:  $x \in A \Leftrightarrow \varphi(x)$

## Enakost in vsebovanost

Množici  $A$  in  $B$  sta *enaki*,

$$A = B \iff \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Množica  $A$  je *podmnožica* množice  $B$ ,

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

relacija *vsebovanosti (inkluzije)*.

Množica  $A$  je *prava podmnožica* množice  $B$ ,

$$A \subset B \iff A \subseteq B \wedge A \neq B$$

relacija *stroge vsebovanosti (stroge inkluzije)*.

## Operacije z množicami

- ▶ *unija*  $A \cup B = \{x; x \in A \vee x \in B\}$
- ▶ *preseka*  $A \cap B = \{x; x \in A \wedge x \in B\}$
- ▶ *razlika*  $A \setminus B = \{x; x \in A \wedge x \notin B\}$
- ▶ *simetrična razlika*  $A + B = \{x; x \in A \veebar x \in B\}$

## Lastnosti operacij

- ▶  $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- ▶  $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$
- ▶  $A \subseteq B \Rightarrow A \cap C \subseteq B \cap C$
- ▶  $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$

Pravimo, da sta množici  $A$  in  $B$  *disjunktni*, če je  $A \cap B = \emptyset$ .

## Univerzalna množica in komplement

*Univerzalna množica*, označimo jo z  $S$ , ustreza področju pogovora v predikatnem računu. Z univerzalno množico se izognemo Russellovemu paradoksu.

*Vse* obravnavane množice so vsebovane v univerzalni množici  $S$ .

*Komplement* množice  $A$ , označimo ga z  $A^c$ , definiramo kot

$$A^c = S \setminus A$$

## Lastnosti komplementa

- ▶  $(A^c)^c = A$
- ▶  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- ▶  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- ▶  $A \setminus B = A \cap B^c$
- ▶  $A \subseteq B \Rightarrow B^c \subseteq A^c$
- ▶  $A \cap B = \emptyset \iff A \subseteq B^c \iff B \subseteq A^c$

## Enakosti z množicami

Pokažimo, da velja

$$A \cup (A \cap B) = A$$

## Sistem enačb

Reši sistem enačb z množicami.

$$X \cup A = A \setminus X$$

$$X \cup A = X$$

## Sistem enačb, še en zgled

Reši sistem enačb z množicami.

$$A \cup X = B$$

$$A \cap X = C$$

## Reševanje sistemov enačb z eno neznano množico

Trditev

$$A \cup B = \emptyset \iff A = \emptyset \wedge B = \emptyset$$

Trditev

$$A + B = \emptyset \iff A = B$$

## Reševanje sistemov enačb z eno neznano množico

Reši sistem enačb z množicami.

$$A \cap X = B \setminus X$$

$$C \cup X = X \setminus A$$

## Reševanje sistemov enačb z eno neznano množico

Postopek:

1. Vse člene prenesemo na levo stran enačb z uporabo enakosti  $B + B = \emptyset$  — vsaki enačbi na obeh straneh "prištejemo" njeno desno stran.

2. Vse enačbe združimo v eno samo z uporabo ekvivalence

$$A = \emptyset \wedge B = \emptyset \iff A \cup B = \emptyset$$

3. Vse operacije izrazimo z  $\cup$ ,  $\cap$  in  $^c$

$$A \setminus B = A \cap B^c \quad A + B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$$

Z uporabo enakosti levo stran enačbe zapišemo kot unijo presekov danih množic, neznane množice ter njihovih komplementov. ("DNO")

## Reševanje sistemov enačb z eno neznano množico

Postopek:

4. Vsak presek oblike  $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ , ker so vse  $A_i$  znane množice ali njihovi komplementi nadomestimo z

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap X) \cup (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap X^c)$$

S tem dosežemo, da v vsakem preseku nastopa bodisi  $X$  bodisi  $X^c$ .

5. Izpostavimo  $X$  in  $X^c$ . Enačba dobi obliko

$$(P \cap X) \cup (Q \cap X^c) = \emptyset$$

6. Velja  $(P \cap X) \cup (Q \cap X^c) = \emptyset \iff P \cap X = \emptyset \wedge Q \cap X^c = \emptyset$   
 $\iff Q \subseteq X \subseteq P^c$

## Reševanje sistemov enačb z eno neznano množico

Odgovor:

Sistem je rešljiv natanko tedaj, ko je

$$A \cap (B \cup C) = \emptyset$$

ali enakovredno

$$B \cup C \subseteq A^c.$$

V tem primeru je rešitev vsaka množica  $X$ , za katero velja

$$B \cup C \subseteq X \subseteq A^c.$$

Parametrično:

$$X = (B \cup C) \cup (T \cap A^c),$$

kjer je  $T$  poljubna množica

## Potenčna množica

*Potenčna množica* množice  $A$ ,  $\mathcal{P}A$ , je množica vseh podmnožic množice  $A$ .

$$\mathcal{P}A = \{B ; B \subseteq A\}$$

Tako  $\emptyset$  kot  $A$  pripadata potenčni množici  $\mathcal{P}A$ .

$$\mathcal{P}\{1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{P}\emptyset = \{\emptyset\} \quad \mathcal{P}\{\emptyset\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

### Izrek

Če ima množica  $A$  natanko  $n$  elementov, potem ima njena potenčna množica  $\mathcal{P}A$  natanko  $2^n$  elementov.



## Družine množic

Naj bo

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3, \dots\} = \{A_i ; i \in \mathcal{I}\}$$

*družina množic.*

*Unija družine*  $\mathcal{A}$  je množica

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i = \{x ; \exists i (i \in \mathcal{I} \wedge x \in A_i)\}$$

*Presek družine*  $\mathcal{A}$  je množica

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i = \{x ; \forall i (i \in \mathcal{I} \Rightarrow x \in A_i)\}$$

## Pokritje in razbitje

Družina množic  $\mathcal{A} = \{A_i ; i \in \mathcal{I}\}$  je *pokritje* množice  $B$ , če je

$$B = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i.$$

Družina množic  $\mathcal{A} = \{A_i ; i \in \mathcal{I}\}$  je *razbitje* množice  $B$ , če je

- ▶  $\mathcal{A}$  pokritje množice  $B$
- ▶ elementi  $\mathcal{A}$  so neprazni in
- ▶ elementi  $\mathcal{A}$  so paroma disjunktni .

## Urejeni pari

*Urejeni par* s *prvo komponento (koordinato)*  $a$  in *drugo komponento (koordinato)*  $b$  označimo z  $(a, b)$  in definiramo kot

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

## Trditev

*(osnovna lastnost urejenih parov)*

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ in } b = d$$

## Kartezični produkt

Kartezični produkt množic  $A$  in  $B$  je množica vseh urejenih parov

$$A \times B = \{(a, b) ; a \in A \wedge b \in B\}$$

## Kartezični produkt

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$  je urejena  $n$ -terica.

Definicijo kartezičnega produkta lahko razširimo na več faktorjev.

### Lastnosti kartezičnega produkta

- ▶  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- ▶  $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
- ▶  $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$

## Lastnosti kartezičnega produkta

- ▶  $A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \vee B = \emptyset$
- ▶  $A \subseteq C \wedge B \subseteq D \implies A \times B \subseteq C \times D$
- ▶  $A \times B \subseteq C \times D \wedge A \times B \neq \emptyset \implies A \subseteq C \wedge B \subseteq D$
- ▶  $A$  končna z  $m$  elementi in  $B$  končna z  $n$  elementi  $\implies$   
 $A \times B$  končna z  $m \cdot n$  elementi.